TABLA 18. Distribución de las familias según sistema de eliminación de excretas y por clasificación del estado de nutrición. Departamento del Atlántico. 1983.

	Estado de nutrición					
	Grupo A		Grupo B		Grupo C	
Sistema	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Inodoro	2	909	8	12.50	25	9.22
Taza sanitaria	5	22.73	20	31.25	39	14.40
Lctrina	10	45.45	25	39.06	98	36.16
Campo abierto	5	22.73	11	17.19	109	40.22
Total	22	100.00	64	100.00	271	100.00

Más del 50% de las famiiias estudiadas, no dan ningún tratamiento al agua de consumo (tabla 17).

En cuanto a los sistemas de eliminación de **cxcretas**, **las proporciones más altas se encontraron** en métodos inadecuados de eliminación (tabla 18).

Las comunidades estudiadas no cuentan con un sistema de recolección de basuras, por lo tanto, la mayoría utiliza la quema para deshacerse de los desechos y desperdicios (tabla 19).

b. Estado fisiológico:

En el grupo e, hay mayor número de población considerada vulnerable que en los otros dos grupos (tabla 20).

En la encuesta de morbilidad, se observó que, del total de los 622 niños menures de 6 años, el 30.5% padeció algCln tipo de enfermedad, correspondiendo un 79.5% del total, al grupo C. Las enfermedades frecuentes fueron las infecciosas y parasitarias (tabla 21).

c. Atención en salud:

Los resultados señalan que el grupo e **presentó las menores proporciones de inmunizaciones con respecto a lo que se observa en** los otros dos grupos (tabla 22).

TABLA 19. Distribución de las familias según el tratamiento dado a las basuras y por clasificación del estado de nutrición. Departamento del Atlántico. 1983.

	Estado de n:.¡trición					
	Grupo A		Grupo B		Grupo C	
Tipo de tratamiento	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Quema	13	59.1	45	70.3	175	64.6
Botar fuera	9	40.9	19	29.7	90	33.2
Ninguno					6	2.2
Total	22	100.0	64	100.0	271	100.0